

## GADO DE CORTE – PASTO

### Campo Águas Fator P



#### Recria e terminação.

Suplemento mineral para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.

#### 100 a 300 g/animal/dia

Produto indicado para animais de recria e terminação, nos mais variados tipos de pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochões cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para eqüídeos.



## GARANTIA

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| NDT (Mín.)                      | 280.00      | g/kg   |
| Selênio (Mín.)                  | 9.00        | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                     | 120.00      | mg/kg  |
| Flúor (Máx.)                    | 340.00      | mg/kg  |
| Metionina (Mín.)                | 5.00        | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                 | 12.00       | mg/kg  |
| Ácido fumárico (Mín.)           | 2900.00     | mg/kg  |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.00 x 10E9 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                   | 63.00       | mg/kg  |
| Colina (Mín.)                   | 800.00      | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)           | 0.90        | mg/kg  |
| Zinco orgânico (Mín.)           | 21.00       | mg/kg  |
| Mananoligossacarídeos (Mín.)    | 120.00      | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)          | 40.26       | mg/kg  |
| Ácido Oleico (Mín.)             | 34.16       | mg/kg  |
| Ômega 3 (Mín.)                  | 5.90        | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                  | 40.26       | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                  | 37.60       | mg/kg  |
| Fator P (Mín.)                  | 20.00       | g/kg   |
| Enxofre (Mín.)                  | 30.00       | g/kg   |
| Sódio (Mín.)                    | 100.00      | g/kg   |
| Cobalto (Mín.)                  | 168.00      | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                    | 1440.00     | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                    | 2500.00     | mg/kg  |
| Proteína Bruta (Mín.)           | 100.00      | g/kg   |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.)    | 45.00       | g/kg   |
| Cálcio (Máx.)                   | 100.00      | g/kg   |
| Cálcio (Mín.)                   | 70.00       | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                  | 34.00       | g/kg   |

**kg:** quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria