

GADO DE CORTE – PASTO

Campo Águas



GARANTIA

NDT (Mín.)	280.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	100.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	45.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	34.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	30.00	g/kg
Sódio (Mín.)	100.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	168.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1440.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	9.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	120.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	340.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	1000.00	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	2900.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Recria e terminação.

Suplemento mineral para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.

100 a 300 g/animal/dia

Produto indicado para animais de recria e terminação, nos mais variados tipos de pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para eqüídeos.

