

GADO DE CORTE – PASTO

Conversor Reprodução Next MC



Cria.

Suplemento mineral Indicado para bovinos de corte na fase de cria, especialmente matrizes e reprodutores. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado no período de boa vegetatividade do capim (período das chuvas).

40 a 50 g/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto ou qualquer outro volumoso.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

GARANTIA

Flúor (Máx.)	450.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	100.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	90.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	20.50	µg/kg
Níquel (Mín.)	4.00	mg/kg
Proteína Bruta (Mín.)	100.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	260.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	172.00	g/kg
Colina (Mín.)	37.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.37	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	12.80	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	205.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	183.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.17	mg/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	3.84 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	3.84 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	3.84 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	3.33 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	1.79 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	710.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	510.00	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	1700.00	mg/kg
Fósforo (Mín.)	45.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	2500.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	18.00	g/kg
Sódio (Mín.)	78.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	5.12 x 10E8	ufc/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

