

GADO DE CORTE – PASTO

Ração TIP Fator P



Terminação

Ração para bovinos. Enriquecida com aditivos e minerais orgânicos ela favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho.

0,5 a 1,5% de Peso Vivo/dia

Produto pronto para uso, consumo varia de 0,5 a 1,5% de Peso Vivo, conforme a indicação do nutricionista. Deve ser fornecido aos animais em cocho de suplementação, de preferência coberto. Bovinos confinados ou semi-confinados devem ser adaptados. Na primeira semana fornecer até 0,6% do peso vivo, podendo chegar ao máximo de 1,3% do peso vivo, com disponibilidade de uma área de cocho de 40 a 60 cm lineares/animal.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Enxofre (Mín.)	1000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	3000.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	3.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	20.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	40.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	70.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.03	mg/kg
Iodo (Mín.)	1.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	120.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	150.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	30.00	g/kg
FDA (Máx.)	200.00	g/kg
Metionina (Mín.)	1.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	1.00	mg/kg
Vitamina E (Mín.)	4.50	ui/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	100.00	mg/kg
Tamponante (Mín.)	4500.00	mg/kg
Colina (Mín.)	40.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.05	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	1.05	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	6.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	2.01	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	1.71	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	5000.00	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.29	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	2.01	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	1.88	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg
Fator P (Mín.)	1000.00	mg/kg
NDT (Mín.)	740.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	140.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	30.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	20.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	12.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	2500.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	2700.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria