

GADO DE CORTE – PASTO

Ureia 10 20A



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral com ureia. Produto indicado para bovinos em fase de cria, recria e terminação no período da seca, manejados em pastagens com boa disponibilidade de massa.

100 a 250 g/animal/dia

Produto pronto para uso. Com consumo podendo variar entre 100 g e 250 g/animal/dia. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal. Animais em condições de suplementação pouco eficientes, devem ser adaptados, utilizando uma mistura crescente com suplemento mineral sem ureia, por uma semana ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para eqüídeos.



GARANTIA

NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	281.10	g/kg
Cálcio (Máx.)	140.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	30.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	140.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	300.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	100.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	100.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	33.30	µg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	500.00	mg/kg
Lisina (Mín.)	600.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	4.50	mg/kg
Colina (Mín.)	140.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	20.78	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	332.64	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	297.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.27	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	8.31 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	5.40 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.91 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	1160.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	830.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria